

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

DHC CONTINUS, 60 mg toimeainet prolungeeritult vabastavad tabletid

Dihüdrokodeiintartraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on DHC CONTINUS ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne DHC CONTINUS'e võtmist
3. Kuidas DHC CONTINUS't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas DHC CONTINUS't säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DHC CONTINUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

DHC CONTINUS toimeainet prolungeeritult vabastavad tabletid sisaldavad toimeainena 60 mg dihüdrokodeiintartraati.

Dihüdrokodeiin kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse analgeetikumideks ehk valuvaigistiteks.

Milleks DHC CONTINUS tablette kasutatakse?

Tablette kasutatakse mõõduka ja tugeva valu leevendamiseks.

Kes võivad neid tablette kasutada?

DHC CONTINUS tablette võivad võtta täiskasvanud, eakad isikud ja üle 12-aastased lapsed.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DHC CONTINUS'E VÕTMIST

Ärge võtke DHC CONTINUS't

Mõned inimesed ei tohi neid tablette kasutada või peaksid nad ravimit võtma tavalisest erinevas annuses.

Enne tablettide kasutama hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile, kui:

- te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga;
- te võtate mõnda depressiooniravimit, näiteks monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit või kui te kasutasite sellist ravimit viimase kahe nädala jooksul;
- teil esineb ülitundlikkus (allergia) dihüdrokodeiini või tablettide mõne teise koostisosa suhtes;
- teie soolestik ei tööta korralikult (paralüütiline iileus)
- teil on pikka aega kestev turse ja armistumise tõttu hingamisteid ahendav kopsuhaigus (raskekujuline krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);
- kui teil on südamehaigus, mis tuleneb kopsuvereringe kroonilisest ülekoormusest (raske kopssüda);
- teil on raskekujuline bronhiaalastma;
- teil esineb tugev hingamise pärssumine ja madal hapnikutase veres (raske hüpoksia);
- teil esineb tugev peavalu või te oksendate, sest need sümptomid võivad viidata, et teie koljusisene rõhk on tõusnud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga DHC CONTINUS

Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil esineb mõni allpool esitatud seisunditest:

- astma;
- pikka aega kestev haigus, mille jooksul hingamisteed ahenevad tursumise ja armistumise tõttu (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);
- või teised hingamistevõime häired;
- krooniline bronhiit;
- kilpnäärmehaigus;
- neeruhaigus;
- maksahaigus;
- sapijuhade või sapijuha häired;
- kõhunäärmepõletik;
- eesnäärme suurenemine;
- kõhukinnisus;
- peavigastus;
- raske südamehaigus;
- opioidide kuritarvitamine või sõltuvus.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Enne tablettide kasutamise hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda depressiooniravimit, näiteks monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit või kui te kasutasite sellist ravimit viimase kahe nädala jooksul.

Teised kesknärvisüsteemile pärssivad toimet avaldavad ained, nende hulgas rahustid või uinutid, fenotiasiinid, ärevusevastased ravimid, antidepressandid, antipsühhootikumid, muud rahustid ja alkohol, võivad põhjustada hingamise pärssimist ja unisust.

DHC CONTINUS'e võtmine koos toidu ja joogiga

Ärge tarvitage nende tablettide kasutamise ajal alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne tablettide kasutamise hakkamist rääkige oma arstile või apteekrile, kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ennast unisena või te ei suuda kontsentreeruda, ärge juhtige autot ega töötage keeruliste mehhanismidega.

Oluline teave mõningate DHC CONTINUS'e koostisainete suhtes

DHC CONTINUS tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne DHC CONTINUS'e võtmist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS DHC CONTINUS'T VÕTTA

Võtke DHC CONTINUS't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage neid tablette ainult juhul, kui need on personaalselt teile välja kirjutatud. Ärge andke neid tablette mitte kunagi teistele inimestele, isegi siis, kui nende sümptomid on samasugused nagu teil. Apteeker kirjutab teie ravimi pakendile, kui palju tablette ja kui sageli te neid võtma peate. Kui teile jääb midagi arusaamatuks, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Ärge närige, murdke* ega purustage tablette.

*DHC CONTINUS 60 mg võib soovitava annuse saamiseks jagada poolitusjoone abil kaheks võrdseks pooleks.

Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on 60...120 mg iga 12 tunni järel. Eakatel patsientidel võivad kasutatavad annused olla väiksemad. Alla 12-aastased lapsed ei tohi neid tablette kasutada.

Te peate tablette manustama iga 12 tunni järel. Näiteks, kui te võtate ühe tableti kell 8 hommikul, tuleb järgmine tablett võtta kell 8 õhtul.

Kui teil on tunne, et DHC CONTINUS'e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudsete ravimvormide parenteraalne manustamine kuritarvitamise eesmärgil põhjustab tõenäoliselt tõsised kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga.

Kui te võtate DHC CONTINUS't rohkem kui ette nähtud

Mida teha, kui keegi võttis juhuslikult sisse minu tablette või kui ma ise võtsin sisse liiga palju tablette?

Võtke viivitamatult ühendust oma arsti või kiirabiga!

Ägeda üleannustamise sümptomid võivad olla: unisus, mis progresseerub stuuporiks (vähene reageerimine välistele ärritajatele) või koomaks, kitsad pupillid, lihaskahjustus, südametegevusega mitteseotud kopsuturse, väga aeglane südamerütm, vererõhu langus ja hingamise pärssimine või hingamispeetus.

Kui te unustate DHC CONTINUS't võtta

Kui te unustate oma tableti manustamata ja järgmise planeeritud annuseni on veel aega, võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub. Edasi jätkake ravi vastavalt ettenähtud skeemile. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka DHC CONTINUS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on tavalisest suurem unisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, suukuivus, iiveldus ja oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on peavalu või pearinglus, kusepeetus, maksaensüümide aktiivsuse tõus, kõhuvalu, vererõhu langus, paresteesiad (torkimistunne sõrmedes ja varvastes), sedatsioon, krambid, nõrkus, segasus, hallutsinatsioonid, meeleolu muutused, lööve koos sügelemisega või ilma, allergiline reaktsioon naha, huulte, keele ja/või kõri tursega (angioödeem), nahaõhetus, nägemishäired, higistamine, vähenenud sugutung, hingeldus ja hingamise pärssimine, kõhulahtisus, soolestik ei tööta korralikult (halvatus-soolesulgus).

Tekkida võivad ravimtaluvuse tõus (tolerantsus) ja sõltuvus. Ravi lõppedes võivad tekkida rahutus ning ärritatud olek.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS DHC CONTINUS'T SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage DHC CONTINUS't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida DHC CONTINUS sisaldab

- Toimeaine on dihüdrokodeiintartraat. DHC CONTINUS toimeainet prolungeeritult vabastavad tabletid sisaldavad toimeainena 60 mg dihüdrokodeiintartraati.
- Abiained on laktoos, ketostearüülalkohol, puhastatud talk, hüdroksüetüülselluloos, magneesiumstearaat, puhastatud vesi, hüpromelloos, makrogool 4000, polüdekstroos.

Kuidas DHC CONTINUS välja näeb ja pakendi sisu

DHC CONTINUS 60 mg: valged kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on märgitud "DHC 60" ja teisel küljel poolitusjoon.
Ühes pakendis on 10 või 56 tabletti.

Apteeker väljastab teile just sellise koguse tablette, nagu arst on teile välja kirjutanud.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mundipharma Ges.m.b.H.
Apolllogasse 16 –18
A-1070 Wien
Austria

Tootja

Mundipharma GmbH
Mundipharmastraße 2
65549 Limburg/Lahn
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati koostöölstatud detsembris 2012