

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

Rosuvastatin Teva 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Rosuvastatin Teva 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Rosuvastatin Teva 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Rosuvastatin Teva 40 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Rosuvastatiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Rosuvastatin Teva ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Rosuvastatin Teva võtmist
3. Kuidas Rosuvastatin Teva't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Rosuvastatin Teva't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Rosuvastatin Teva ja milleks seda kasutatakse

Rosuvastatiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse statiinideks.

Teile on määratud raviks Rosuvastatin Teva, sest

- teil on kõrge kolesteroolitase veres. See tähendab, et teil on risk haigestuda südamelihaseinfarkti või ajurabandusse (ajuinsulti).

Teile on soovitatud kasutada statiini, sest toiduharjumuste muutmisest ja kehalistest harjutustest ei piisanud kolesterooli kõrge sisalduse vähendamiseks veres. Rosuvastatin Teva kasutamise ajal peate te jätkama kolesterooli langetavat dieeti ja kehalisi harjutusi.

Või

- teil on teised riskitegurid, mis tõstavad teie riski haigestuda südamelihaseinfarkti, ajurabandusse või sarnastesse terviseprobleemidesse.

Südamelihaseinfarkti, ajurabandust ja nendele sarnaseid terviseprobleeme põhjustab haigus nimega ateroskleroos. Ateroskleroos tekib seetõttu, et teie arteritesse (veresoontesse) tekivad rasva päritolu ladestused.

Miks on oluline Rosuvastatin Teva't pidevalt kasutada?

Rosuvastatin Teva't kasutatakse, vähendamaks veres ringlevate rasvühendite – lipiidide (peamiselt kolesterooli) taset.

Veres on erinevat tüüpi kolesterooli – nn „halb“ kolesterool (LDL-C) ja „hea“ kolesterool (HDL-C).

- Rosuvastatin Teva võib vähendada „halva“ kolesterooli ja suurendada „hea“ kolesterooli taset veres.
- See ravim aitab tõkestada „halva“ kolesterooli tootmist kehas ning parandab keha võimet eemaldada seda verest.

Enamiku inimeste jaoks ei tekita kõrge kolesteroolitase mingeid aistinguid, sest see ei tekita mingeid haigusnähte. Kuid ravimata jätmisel võivad kogu organismi verega varustavate veresoonte seintes tekkida ladestused, mis aja jooksul vähendavad veresoonte valendikku.

Kitsenenud valendikuga veresooned võivad ummistuda, mis põhjustab südame või aju verevarustuse katkemise ja südameelihaseinfarkti või ajurabanduse tekkimise. Oma kolesteroolitaseme langetamise läbi saate te südamelihaseinfarkti, ajurabanduse või sarnaste terviseprobleemide tekkeriski vähendada.

Te peate Rosuvastatin Teva't pidevalt võtma, isegi siis, kui teie kolesteroolitase veres on normaliseerunud, kuna see hoiab ära teie kolesteroolitaseme uue tõusu ja rasva ladestumise veresoonte seintes. Siiski, kui arst soovib teil ravi katkestada, või kui te olete rasestunud, tuleb ravi katkestada.

2. Mida on vaja teada enne rosuvastatin teva võtmist

Ärge võtke Rosuvastatin Teva't:

- kui olete rosuvastatiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergiline reaktsioon võib hõlmata nahalöövet, sügelust, hingamisraskust või näo, huulte, kurgu või keele turset;
- kui te olete rase või toidate last rinnaga. Kui te rasestute Rosuvastatin Teva võtmise ajal, lõpetage otsekohe ravimi võtmine ja rääkige sellest oma arstile. Naised peavad Rosuvastatin Teva võtmise ajal rasestumist vältima, kasutades sobivat rasestumisvastast vahendit;
- kui teil on maksahaigus;
- kui teil on raske neeruhaigus;
- kui teil on korduvad või seletamatud lihasvalud;
- kui te võtate ravimit, mis sisaldab sellist ainet nagu tsüklosporiin (mida kasutatakse näiteks pärast elundisiirdamist).

Kui midagi eespool mainitust kehtib teie kohta, pöörduge palun oma arsti poole.

Ärge võtke Rosuvastatin Teva 40 mg (ravimi kõige suurem tugevus):

- kui teil on mõõdukas neeruhaigus (kahtluse korral küsige palun oma arstilt);
- kui teie kilpnääre ei tööta korralikult;
- kui teil on olnud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid, kui teil endal või kellelgi teie perekonnast on esinenud lihashaigust või on eelnevalt esinenud lihashaigust mõnda teist kolesteroolitaset langetavat ravimit võttes;
- kui te joote regulaarselt suures koguses alkoholi;
- kui te olete aasia päritolu (jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane või indialane);
- kui te võtate kolesteroolitaseme langetamiseks teisi ravimeid, mida nimetatakse fibraatideks.

Kui midagi eespool mainitust kehtib teie kohta (või te kahtlete milleski), pöörduge palun oma arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ravi ajal jälgib arst teid hoolikalt, kui teil on suhkurtõbi või risk selle tekkeks. Teil on tõenäoliselt risk suhkurtõve tekkeks, kui teie vere suhkru- ja rasvasisaldus on kõrge, te olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk.

Enne ravi Rosuvastatin Teva'ga rääkige oma arstile:

- kui teil on neeruhaigus;
- kui teil on maksahaigus;
- kui teil on korduvaid või seletamatuid lihasvalusid, kui teil endal või kellelgi teie perekonnast on esinenud lihashaigust või on eelnevalt esinenud lihashaigust mõnda teist kolesteroolitaset

- langetavat ravimit võttes. Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil on seletamatud lihasvalud, eriti kui te tunnete ennast haigena või teil on palavik;
- kui te joote regulaarselt suures koguses alkoholi;
 - kui teie kilpnääre ei tööta korralikult;
 - kui te võtate kolesteroolitaseme langetamiseks teisi ravimeid, mida nimetatakse fibraatideks. Palun lugege hoolikalt seda infolehte, isegi kui te olete enne võtnud teisi kolesteroolitaset langetavaid ravimeid;
 - kui te võtate ravimeid, mida kasutatakse HIV-infektsiooni vastu võitlemiseks, nt ritonaviiri koos lopinaviiriga ja/või atasanaviiriga, palun vt „Muud ravimid ja Rosuvastatin Teva“;
 - kui teil on interstitsiaalne kopsuhaigus;
 - kui teil on raske hingamispuudulikkus;
 - kui teile on tehtud vereanalüüs ja teie tühja kõhu glükoositase (veresuhkur) on keskmisest kõrgem (vahemikus 5,6...6,9 mmol/l);
 - kui patsient on alla 10-aastane: Rosuvastatin Teva't ei tohi manustada alla 10-aastastele lastele;
 - kui patsient on alla 18-aastane: Rosuvastatin Teva 40 mg tablette ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel;
 - kui te olete üle 70-aastane (sest teie arst peab valima teile õige Rosuvastatin Teva algannuse, mis teile sobib);
 - kui te olete aasia päritolu, see tähendab jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane või indialane. Teie arst peab valima teile õige Rosuvastatin Teva algannuse, mis teile sobib;
 - kui te lähete haiglasse või saate ravi mõne teise seisundi jaoks. Rääkige meditsiinipersonalile, et te võtate Rosuvastatin Teva't.

Kui midagi eespool mainitust kehtib teie kohta (või kui te kahtlete milleski):

- Ärge võtke Rosuvastatin Teva 40 mg (ravimi kõige suurem tugevus) ja pöörduge oma arsti või apteekri poole enne, kui te tegelikult hakkate võtma mõnda muud Rosuvastatin Teva tugevust.

Väiksel arvul inimestest võib rosuvastatiin mõjutada maksa. Seda saab kindlaks teha lihtsa testiga, mis otsib veres maksaensüümide suurenenud tasemeid. Sel põhjusel teeb teie arst teile tavaliselt selle veretesti (maksafunktsiooni test) enne Rosuvastatin Teva ravi ja ravi ajal.

Lapsed ja noorukid

Alla 10-aastased lapsed

Rosuvastatiini ei tohi anda alla 10-aastastele lastele.

Lapsed ja noorukid (10...18-aastased)

Rosuvastatin Teva 40 mg ei tohi kasutada 10...18-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Rosuvastatin Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kindlasti rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

- tsüklosporiin (kasutatakse näiteks pärast elundisiirdamist),
- varfariin (või mõni muu ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks),
- fibraadid (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks, näiteks gemfibrosiil, fenofibraat) või mistahes muu ravim, mida kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks (näiteks esetimiib),
- seedehäirete ravimid (kasutatakse teie maohappe neutraliseerimiseks),
- erütromütsiin (antibiootikum),
- suukaudsed rasestumisvastased vahendid (pillid),
- hormoonasendusravi,
- ritonaviir koos lopinaviiriga ja/või atasanaviiriga (kasutatakse HIV-nakkuse vastu võitlemiseks) – palun vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Rosuvastatin Teva võib muuta ülalmainitud ravimite toimeid või need ravimid võivad muuta Rosuvastatin Teva toimeid.

Rosuvastatin Teva koos toidu ja joogiga

Rosuvastatin Teva't võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Rosuvastatin Teva tablette raseduse ega imetamise ajal. Kui te rasestute Rosuvastatin Teva võtmise ajal, lõpetage otsekohe ravimi võtmine ja rääkige sellest oma arstile. Naised peavad vältima rasestumist Rosuvastatin Teva võtmise ajal, kasutades sobivat rasestumisvastast vahendit. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enamik inimesi võivad Rosuvastatin Teva kasutamise ajal autot juhtida ja masinaid käsitseda – see ei mõjuta nende võimekust. Siiski võivad mõned inimesed tunda Rosuvastatin Teva ravi ajal pearinglust. Kui see juhtub, pidage nõu oma arstiga, enne kui te proovite autot juhtida või mistahes masinaid või mehhanisme käsitseda.

Rosuvastatin Teva sisaldab laktoosi, päikeseloojangukollast ja karmosiini

Patsiendid, kes ei talu laktoosi (piimasuhkur), peavad silmas pidama, et Rosuvastatin Teva õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad väikses koguses laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

5 mg tablettide kate sisaldab päikeseloojangukollast FCF (E110) ja 10 mg, 20 mg ning 40 mg tablettide kate sisaldab karmosiini (E122). Need värvained võivad tekitada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Rosuvastatin Teva't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on üks kord ööpäevas, võetuna koos toiduga või ilma. Neelake soovitatud tablettide annus alla koos vähese koguse veega.

Algannus

Teie ravi Rosuvastatin Teva'ga peab algama 5 mg või 10 mg annusega, isegi kui te olete enne võtnud mõnda teist kolesteroolitaset langetavat ravimit suuremas annuses. Teie algannuse valik sõltub:

- teie kolesteroolitasemest;
- teie südameinfarkti või insuldi riskitasemest;
- sellest, kas teil on riskitegureid, mis võivad teid muuta tundlikumaks võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Palun pöörduge oma arsti või apteekri poole, et teada saada, milline Rosuvastatin Teva algannus sobib teile kõige paremini.

Teie arst võib otsustada anda teile kõige väiksema (5 mg) annuse:

- kui te olete aasia päritolu (jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane või indialane);
- kui te olete üle 70-aastane;
- kui teil on mõõdukas neeruhaigus;
- kui teil on risk lihasvalude tekkeks.

Annuse suurendamine ja maksimaalne ööpäevane annus

Teie arst võib otsustada teie annust suurendada. See on selleks, et te võtaksite Rosuvastatin Teva't sellises koguses, mis on teile õige. Kui te alustasite 5 mg annusega, võib teie arst otsustada seda

kahekordistada 10 mg-ni, seejärel 20 mg-ni ja seejärel vajadusel maksimaalse annuseni 40 mg. Kui te alustasite 10 mg annusega, võib teie arst otsustada seda kahekordistada 20 mg-ni ja seejärel vajadusel maksimaalse annuseni 40 mg. Iga annuse kohandamise vahel on neljanädalane vahe.

Rosuvastatin Teva maksimaalset ööpäevast annust 40 mg määratakse ainult patsientidele, kellel on kõrge kolesteroolitase ja suur risk südameinfarkti või insuldi tekkeks ja kellel kolesteroolitase ei lange piisavalt 20 mg annusega.

Tavaline annus 10...17-aastastel lastel

Tavaline algannus on 5 mg ööpäevas. Teie arst võib otsustada annust suurendada selleks, et leida teile sobiv Rosuvastatin Teva annus. Maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg. Võtke Rosuvastatin Teva't üks kord ööpäevas. Rosuvastatin Teva 40 mg tablette ei tohi kasutada lastel.

Tablettide võtmine

Neelake iga tablett alla tervelt koos joogiveega. Ärge närige tablette.

Võtke Rosuvastatin Teva't üks kord ööpäevas. Te võite seda võtta mistahes ajal päeva jooksul.

Püüdke võtta oma tablett iga päev ühel ja samal ajal, et aidata teil selle võtmist meeles pidada.

Regulaarsed kolesteroolitaseme kontrollid

On oluline, et te pöörduksite tagasi oma arsti poole regulaarseks kolesteroolitaseme kontrolliks, et veenduda selles, et teie kolesteroolitase on jõudnud õige tasemeni ja püsib seal.

Teie arst võib otsustada teie annust suurendada, nii et te võtate Rosuvastatin Teva't sellises koguses, mis on teile õige.

Kui te võtate Rosuvastatin Teva't rohkem kui ette nähtud

Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge nõuande saamiseks lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda ja ärge unustage oma ravimit endaga kaasa võtta.

Kui te unustate Rosuvastatin Teva't võtta

Kui teil jääb annus vahele, ärge muretsege, vaid võtke see sisse niipea kui võimalik. Siiski, kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, jätke vahelejäänud annus võtmata ja jätkake nagu varem. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Rosuvastatin Teva võtmise

Selle otsuse võib langetada vaid teie arsti nõusolekul, kuna teie kolesteroolitase tõenäoliselt tõuseb, kui rosuvastatiini võtmine lõpetada.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Lõpetage Rosuvastatin Teva võtmine ja pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole kui teil on mõni järgmistest allergilistest reaktsioonidest:

- hingamisraskus koos näo, huulte, keele ja/või kurgu tursega või ilma;
- näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamisraskust;
- raske nahasügelus (koos kõrgenenud muhkudega).

Lõpetage Rosuvastatin Teva võtmine ja rääkige otsekohe oma arstiga ka siis, kui teil on mistahes ebatavalised valud lihastes, mis kestavad kauem, kui te võiksite oodata. Nagu teiste kolesteroolitaset langetavate ravimitega, on väga väike arv inimesi kogenud ebameeldivaid lihaste kõrvaltoimeid ja

need on harva jätkunud ja muutunud potentsiaalselt eluohtlikuks lihaskahjustuseks, mida tuntakse *rabdomioliüüsi* nime all.

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st:

- peavalu;
- pearinglus;
- kõhukinnisus;
- haiglane tunne;
- kõhuvalu;
- lihasvalu;
- diabeet. Selle teke on tõenäolisem, kui teie vere suhkru- ja rasvasisaldus on kõrge, te olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal;
- nõrkuse tunne.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st :

- nahalööve, sügelus ja nõgeslööve (nõgestõbi).

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st:

- madal trombotsüütide arv veres (trombotsütopeenia);
- tugev kõhuvalu (mida põhjustab kõhunäärme põletik);
- lihaskahjustus – ettevaatusabinõuna lõpetage Rosuvastatin Teva võtmise ja rääkige otsekohe oma arstiga, kui teil on mistahes ebatavalised valud lihastes, mis kestavad kauem, kui võiks oodata;
- raske allergiline reaktsioon – selle nähtude hulka kuuluvad näo, huulte, keele ja/või kõri turse, neelamis- ja hingamisraskus, raske nahasügelus (koos kõrgeenenud muhkudega). Kui te arvate, et teil on allergiline reaktsioon, siis lõpetage Rosuvastatin Teva võtmise ja pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole;
- suurenenud maksaensüümide aktiivsus veres.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st:

- teie jalgade ja käte närvide kahjustus (näiteks tuimus);
- mälukaotus;
- vere jälgede esinemine uriinis;
- liigesvalu;
- naha ja silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus);
- maksapõletik (hepatiit);
- günekomastia (rinnanäärmete suurenemine meestel).

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

- vedel väljaheide (kõhulahtisus);
- tõsine villiline naha-, suu-, silmade ja suguelundite seisund, mida tuntakse Stevensi-Johnsoni sündroomi nime all;
- unehäired, sh unetus ja õudusunenäod;
- seksuaalfunktsiooni häired;
- depressioon;
- hingamisprobleemid, sh püsiv kõha ja/või hingeldus või palavik;
- ödeem (tursed);
- kõõluste probleemid;
- lihasnõrkus, mis on püsiv

Rosuvastatin Teva 40 mg võtmise ajal on samuti võimalik valgu hulga tõus uriinis – tavaliselt kaob see muutus iseenesest, ilma et ravi Rosuvastatin Teva'ga oleks vaja katkestada (ainult Rosuvastatin Teva 40 mg puhul).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Rosuvastatin Teva't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Rosuvastatin Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg ja 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida blister välispakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Rosuvastatin Teva't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast "Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rosuvastatin Teva sisaldab

- Toimeaine on rosuvastatiin (rosuvastatiinkaltsiumina). Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 20 mg või 40 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina).
- Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos (Avicel PH-112), krospovidoon (tüüp A) (Kollidon CL), veevaba laktoos, povidoon (PVP K-30), naatriumstearüülfumaraat (PRUV).

Tableti kate:

Rosuvastatin Teva 5 mg: *Opadry II* oranž: osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350 (polüetüleenglükool), talk (E553b), kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), päikeseloojangukollane FCF (E110, FD&C Kollane #6).

Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg ja 40 mg: *Opadry II* roosa: osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350 (polüetüleenglükool), talk (E553b), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), karmosiin (E122), indigokarmiin (E132, FD&C sinine #2)

Kuidas Rosuvastatin Teva välja näeb ja pakendi sisu

Rosuvastatin Teva 5 mg tablett: oranž ümmargune standardkumerusega õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud "N" ja teisele küljele "5".

Rosuvastatin Teva 10 mg tablett: heleroosa kuni roosa ümmargune standardkumerusega õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud "N" ja teisele küljele "10".

Rosuvastatin Teva 20 mg tablett: heleroosa kuni roosa ümmargune standardkumerusega õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud "N" ja teisele küljele "20".

Rosuvastatin Teva 40 mg tablett: heleroosa kuni roosa ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on sisse pressitud "N" ja teisele küljele "40".

Rosuvastatin Teva on saadaval karpi pakitud blisterpakendites, milles on 14, 14 x 1, 15, 15 x 1, 20, 20 x 1, 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 56, 56 x 1, 60, 60 x 1, 90, 90 x 1, 98, 98 x 1, 100 ja 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

TEVA Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542DR Utrecht

Holland

Tootjad

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305

74770 Opava-Komarov

Tšehhi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013