

Pakendi infoleht: teave kasutajale

MEDIKINET 5 mg, tabletid

MEDIKINET 10 mg, tabletid

MEDIKINET 20 mg, tabletid

Metüülfenidaatvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on MEDIKINET ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne MEDIKINET'i võtmist
3. Kuidas MEDIKINET'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas MEDIKINET'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on MEDIKINET ja milleks seda kasutatakse

Milleks kasutatakse

MEDIKINET'i kasutatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) raviks.

- Ravimit kasutatakse lastel ja noorukitel vanuses 6 kuni 18 aastat.
- Ravimit kasutatakse ainult siis, kui on proovitud ravida ilma ravimiteta. Näiteks nõustamise ja käitumisravi abil.

MEDIKINET ei ole mõeldud kasutamiseks ATH raviks noorematel kui 6-aastastel lastel või täiskasvanutel. On teadmata, kas see ravim on neile ohutu või kas see toob neile kasu.

Kuidas ravim toimib

MEDIKINET parandab teatud väheaktiivsete ajupiirkondade aktiivsust. Ravim võib aidata parandada tähelepanu (tähelepanu ulatus), kontsentreerumisvõimet ja vähendada impulsiivset käitumist.

Ravimit manustatakse raviprogrammi osana, mis hõlmab tavaliselt:

- psühholoogilisi
- pedagoogilisi ja
- sotsiaalseid meetmeid.

MEDIKINET ravi võib määrata ainult laste ja/või noorukite käitumisprobleemide ravile spetsialiseerunud arst. Kuigi ATH ravi puudub, võib raviprogramme kasutades sellega toime tulla.

ATH'st

ATH'ga lastel ja noorukitel on:

- raske paigal istuda ja
- raske süveneda.

See ei ole nende süü, et nad neid asju teha ei suuda.

Paljud lapsed ja noored inimesed pingutavad, et neid tegevusi teha. Siiski, koos ATH'ga võivad need põhjustada probleeme igapäevaelus. ATH'ga lastel ja noortel võib esineda raskusi õppimisel ja koduste ülesannete tegemisel. Neil võib olla raske käituda hästi kodus, koolis või teistes kohtades. ATH ei mõjuta lapse või nooruki intelligentsust.

2. Mida on vaja teada enne MEDIKINET'i võtmist

Ärge võtke MEDIKINET'i kui teil või teie lapsel on:

- kui olete metüülfenidaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kilpnäärme probleemid;
- suurenenud silma siserõhk (glaukoom);
- neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom);
- söömisprobleem, mille korral te ei tunne nälga või soovi süüa – nt *anorexia nervosa*;
- väga kõrge vererõhk või veresoonte ahenemine, mis võib põhjustada valu kätes ja jalgades;
- kunagi olnud probleeme südamega – nt südameinfarkt, südame rütmihäire, valu ja ebamugavustunne rinnus, südamepuudulikkus, südamehaigus või kaasasündinud südameprobleem;
- olnud probleeme aju veresoontega – nt insult, veresoone mõne osa turse ja nõrgenemine (aneürüsm), ahenenud või ummistunud veresooneid või veresoonte põletik (vaskuliit);
- võtab või on võtnud viimase 14 päeva jooksul antidepressanti (tuntud kui monoaminooksüdaasi inhibiitor) – vt lõik „Muud ravimid ja MEDIKINET“;
- vaimse tervise probleeme, nt:
 - „psühhopaatilise“ või „piiripealse isiksuse“ probleem;
 - ebanormaalsed mõtted või nägemused või haigus, mida nimetatakse skisofreeniaks;
 - raske meeleoluprobleemi nähud, nt:
 - tunne, et tapaks ennast;
 - raske depressioon, mille korral tunnete ennast väga kurva, väärtusetu ja lootusetuna;
 - maania, mille korral tunnete ennast ebatavaliselt erutatuna, üliaktiivsena ja pidurdamatuna.

Ärge võtke metüülfenidaati, kui midagi eelnevast kehtib teie või teie lapse kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne, kui teie või teie laps hakkab võtma metüülfenidaati. Seda põhjusel, et metüülfenidaat võib neid probleeme süvendada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne MEDIKINET'i võtmist pidage nõu oma arstiga kui teil või teie lapsel on:

- maksa- või neeruprobleemid;
 - probleeme neelamisega või tervete tablettide allaneelamisega;
 - soolte või söögitoru ahenemine või ummistus;
 - olnud krampihooosid (krambid, konvulsioonid, epilepsia) või kõrvalekaldeid aju skaneeringus (EEG's);
 - kunagi kuritarvitanud alkoholi, retseptiravimeid või tänavanarkootikume või kui on esinenud sõltuvus nendest;
 - patsient on naissoost ja tal on alanud menstruatsioonid (vt lõik „Rasedus ja imetamine“ allpool);
 - raskesti kontrollitavaid korduvaid tõmbelusi mistahes kehaosas või ta kordab häält ja sõnu;
 - kõrge vererõhk;
 - südameprobleem, mida ei ole nimetatud lõigus „Ärge võtke MEDIKINET'i“ ülalpool;
 - vaimse tervise probleem, mida ei ole nimetatud lõigus „Ärge võtke MEDIKINET'i“ ülalpool.
- Muude vaimse tervise probleemide hulka kuuluvad:
- meeleolu kõikumised (maniakaalsest depressiivseni – nimetatakse „bipolaarseks häireks“);
 - agressiivseks või vaenulikuks muutumine või agressiivsuse süvenemine;
 - ebareaalsete asjade nägemine, kuulmine või tundmine (hallutsinatsioonid);
 - asjade uskumine, mis ei vasta tõe (pettekujutlused);
 - ebatavaline umbusklikkus (paranoia);
 - agiteeritus, ärevus või pingetunne;
 - depressioon või süütunne.

Rääkige oma arsti või apteekriga enne ravi alustamist, kui midagi ülalmainitust kehtib teie või teie lapse kohta. Seda põhjusel, et metüülfenidaat võib neid probleeme süvendada. Teie arst soovib jälgida, kuidas ravim teid või teie last mõjutab.

Mida arst kontrollib enne kui teie või teie laps alustate metüülfenidaadi võtmist

Neid asju kontrollitakse, et otsustada, kas metüülfenidaat on teile või teie lapsele õige ravim. Teie arst arutab teiega järgmist:

- milliseid teisi ravimeid võtate teie või võtab teie laps;
- kas perekonnas on esinenud seletamatut äkksurma;
- mistahes teisi meditsiinilisi probleeme (nt südameprobleemid), mis võivad esineda teil või teie perekonnas;
- kuidas teie või teie laps ennast tunneb, näiteks kas meeleolu on tõusnud või langenud, kas on veidraid mõtteid või kas teil või teie lapsel on midagi sellist varem esinenud;
- kas perekonnas on esinenud „tikke“ (kontrollile raskesti alluvaid korduvaid tõmbulisi mistahes kehaosas või korduvaid häämitsusi ja sõnu);
- milliseid vaimse tervise või käitumisprobleeme on teil, teie lapsel või teistel perekonnaliikmetel kunagi esinenud.

Teie arst arutab teiega, kas teil või teie lapsel on risk meeleolu kõikumiste tekkeks (maniakaalsest kuni depressiivseni – nimetatakse bipolaarseks häireks). Nad kontrollivad teie ja teie lapse vaimse tervise anamneesi ja kontrollivad, kas kellelgi teie perest on esinenud enesetappu, bipolaarset häiret või depressiooni.

On oluline, et annaksite arstile nii palju informatsiooni kui suudate. See aitab teie arstil otsustada, kas metüülfenidaat on teile või teie lapsele õige ravim. Arst võib otsustada, milliseid täiendavaid meditsiinilisi uuringuid on vaja, enne kui te hakkate või teie laps hakkab ravimit võtma.

Narkotestid

See ravim võib anda narkotestil positiivse tulemuse.

Sportlased peavad teadma, et ravim võib anda anti-dopingu analüüsil positiivse tulemuse.

Muud ravimid ja MEDIKINET

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke metüülfenidaati, kui teie või teie laps:

- võtab ravimit, mida nimetatakse monoaminooksüdaasi inhibiitoriks (MAOI), mida kasutatakse depressiooni korral, või on võtnud MAOI-d viimase 14 päeva jooksul. MAOI võtmine koos metüülfenidaadiga võib põhjustada vererõhu järsku tõusu.

Kui teie või teie laps võtab mingeid teisi ravimeid, võib metüülfenidaat mõjutada nende toimet või põhjustada kõrvaltoimeid. Pidage enne metüülfenidaadi võtmist nõu oma arsti või apteekriga, kui võtate või teie laps võtab mistahes järgmist ravimit:

- teisi depressiooniravimeid;
- raskete vaimse tervise probleemide ravimeid;
- epilepsia ravimeid;
- vererõhku langetavaid või tõstavaid ravimeid;
- mõningaid köha ja külmetuse preparaate, mis sisaldavad ravimeid, mis võivad mõjutada vererõhku. On tähtis kontrollida koos apteekriga, kui ostate mistahes sellist ravimit;
- ravimeid, mis vedeldavad verd, et vältida verehüüvete moodustumist.

Kui te ei ole kindel, kas mõni ravim, mida teie või teie laps võtab, kuulub ülaltoodud loendisse, küsige enne metüülfenidaadi võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Operatsioon

Rääkige oma arstile, kui teil või teie lapsel plaanitakse operatsiooni. Metüülfenidaati ei tohi võtta operatsioonipäeval, kui kasutatakse teatud tüüpi anesteetikume. Seda põhjusel, et esineb võimalus vererõhu järsuks tõusuks operatsiooni ajal.

MEDIKINET koos toidu ja joogiga

MEDIKINET'i võtmine koos toiduga võib leevendada kõhuvalu, iiveldust või oksendamist.

Metüülfenidaat koos alkoholiga

Seda ravimit võttes ärge tarvitage alkoholi. Alkohol võib selle ravimi kõrvaltoimeid võimendada. Pidage meeles, et teatud toidud ja ravimid sisaldavad alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

On teadmata, kas metüülfenidaat mõjutab sündimata last. Rääkige oma arstile või apteekrile enne metüülfenidaadi võtmist, kui teie või teie tütar:

- on seksuaalselt aktiivne. Arst selgitab, milliseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutada;
- on rase või võib olla rase. Arst otsustab, kas metüülfenidaati tohib võtta;
- imetab või plaanib imetamist. On võimalik, et metüülfenidaat eritub inimese rinnapiima. Sel põhjusel otsustab arst, kas teie või teie tütar võib metüülfenidaadi kasutamise ajal imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Metüülfenidaadi kasutamisel võib teil või teie lapsel esineda peeringlust, probleeme pilgu fokuseerimisega või hägust nägemist. Kui need kõrvaltoimed esinevad, võib olla ohtlik sooritada selliseid tegevusi, nagu juhtida autot, kasutada masinaid, sõita jalgrattaga või ratsutada või ronida puu otsa.

MEDIKINET sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas MEDIKINET'i võtta

Kui palju ravimit võtta

Võtke MEDIKINET'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Maksimaalne ööpäevane annus on 60 mg.

- Teie arst alustab ravi tavaliselt väikese annusega, 5 mg metüülfenidaati üks või kaks korda ööpäevas hommiku- ja lõunasöögi ajal ning suurendab seda järk-järgult, vastavalt vajadusele.
- Teie arst ütleb teile, milline on teie ööpäevane annus.
- Et vältida uinumisraskusi, ei tohiks üldiselt viimast annust võtta 4 tunni jooksul enne magamaminemist.

Teie arst teeb mõned uuringud

- enne kui teie või teie laps alustab ravi - et olla kindel MEDIKINET'i ohutuses ja et sellest on kasu;
- pärast seda kui teie või teie laps on ravi alustanud – neid korratatakse vähemalt iga 6 kuu järel, kuid võimalik, et palju sagedamini. Neid tehakse ka annuse muutmisel;
- nende uuringute hulka kuuluvad:
 - söögiisu kontroll;
 - kehapikkuse ja kehakaalu mõõtmine;
 - vererõhu ja südame löögisageduse mõõtmine;
 - meeoluprobleemide, vaimse seisundi või mistahes muude ebatavaliste tundmuste kontroll. Või kas need on MEDIKINET'i võtmise ajal halvenenud.

Kuidas ravimit võtta

Ravim on suukaudseks kasutamiseks.

Teie või teie laps peate MEDIKINET'i tabletid neelama koos veega tervelt alla. Vajadusel saab tabletti poolitada. Võtke tabletid söögi ajal või pärast sööki.

Kui teie või teie laps ei tunne ennast paremini pärast 1-kuulist ravi

Kui teie või teie laps ei tunne ennast paremini, rääkige sellest oma arstile. Ta võib otsustada, et vajalik on teistsugune ravi.

Pikaajaline ravi

MEDIKINET'i ei ole vaja võtta määramatult kaua. Kui teie või teie laps võtate MEDIKINET'i rohkem kui ühe aasta, peab teie arst ravi lühikeseks ajaks peatama, see võib toimuda koolivaheajal. See näitab, kas ravim on veel vajalik.

Kui MEDIKINET'i ei kasutata õigesti

Kui MEDIKINET'i ei kasutata õigesti, võib see põhjustada ebanormaalset käitumist. See võib tähendada ka seda, et teil või teie lapsel tekib sõltuvus sellest ravimist. Rääkige oma arstile, kui teil või teie lapsel on kunagi esinenud alkoholi, retseptiravimite või tänavanarkootikumide kuritarvitamist või sõltuvust nendest.

Kui teie või teie laps võtate MEDIKINET'i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate või teie laps võtab liiga palju ravimit, rääkige otsekohe arstiga või kutsuge kiirabi. Teatage neile, kui palju ravimit on võetud.

Üleannustamisel võivad esineda järgmised nähud: oksendamine, rahutus, värisemine, tahtmatute liigutuste sagenemine, lihastõmbused, krambihood (millele võib järgneda kooma), ülevoolav õnnetunne, segasustunne, ebareaalsete asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid), higistamine, nahaõhetus, peavalu, kõrge palavik, südame löögisageduse muutused (aeglustumine, kiirenemine või rütmihäired), vererõhu tõus, laienenud pupillid, nina- ja suukuivus.

Kui teie või teie laps unustate MEDIKINET'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui teie või teie laps unustab annuse võtta, oodake kuni on aeg võtta järgmine annus.

Kui teie või teie laps lõpetate MEDIKINET'i võtmise

Kui teie või teie laps lõpetab järsku selle ravimi võtmise, võivad ATH sümptomid tagasi tulla või ilmnedu kõrvaltoimed, nt depressioon. Enne ravimi lõplikku ärajätmist võib teie arst soovida igapäevaselt võetavat kogust järk-järgult vähendada. Enne MEDIKINET 'i ärajätmist rääkige oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teie arst räägib teile neist kõrvaltoimetest.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil või teie lapsel esineb mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, pöörduge otsekohe arsti poole:

Sage (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st)

- ebaregulaarne südame löögisagedus (palpitatsioonid);
- meeleolu muutused või meeleolu kõikumine või isiksuse muutused.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st)

- enesetapumõtted või tunne, et tapaks ennast;
- ebareaalsete asjade nägemine, tundmine või kuulmine, need on psühhoosi nähud;

- kontrollimatu kõne ja kehaliigutused (Tourette'i sündroom);
- allergia nähud, nt lööve, sügelus või nõgeslööve nahal, näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse, hingeldus, vilistav hingamine või hingamisraskused.

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st)

- ebatavaline elevustunne, üliaktiivsus ja pidurdamatus (maania).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10000-st)

- südameinfarkt;
- krambihood (krambid, konvulsioonid, epilepsia);
- naha ketendamine või lillakaspunased laigud;
- lihasspasmid, mis ei allu teie kontrollile, mis mõjutavad teie silmi, pead, kaela, keha ja närvisüsteemi – aju verevarustuse ajutise puudumise tõttu;
- halvatus või probleemid liigutuste ja nägemisega, kõneraskus (need võivad olla aju veresoonte probleemidest tingitud nähud);
- vererakkude (punaverelibleid, valgeverelibleid ja vereliistakud) arvu vähenemine, mis võib teid muuta infektsioonidele vastuvõtlikumaks, ning teil võivad kergemini tekkida verejooksud ja verevalumid;
- järsk kehatemperatuuri tõus, väga kõrge vererõhk ja rasked tõmbused (maliigne neuroleptiline sündroom). Ei ole kindel, kas selle kõrvaltoime põhjuseks on metüülfenidaat või teised ravimid, mida võidakse võtta kombinatsioonis metüülfenidaadiga.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- soovimatud mõtted, mis pidevalt korduvad;
- põhjuseta minestamine, valu rinnus, hingeldus (need võivad olla südameprobleemide sümptomid).

Kui teil või teie lapsel esineb mõni ülalmainitud kõrvaltoimetest, pöörduge otsekohe arsti poole.

Muud kõrvaltoimed on järgmised, kui need muutuvad tõsiseks, rääkige oma arsti või apteekriga:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 kasutajat 10-st)

- peavalu;
- närvilisus;
- võimetus magada.

Sage (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st)

- liigesvalu;
- suukuivus;
- kõrge kehatemperatuur (palavik);
- ebatavaline juuste väljalangemine või hõrenemine;
- ebatavaline unisus või uimasus;
- söögiisu kaotus või söögiisu vähenemine;
- sügelus, nahalööve või nahapinnast kõrgemad punased lööbeelemendid (nõgeslööve);
- kõha, kurguvalu või nina ja kurgu ärritus;
- kõrge vererõhk, südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia);
- pearinglustunne, kontrollimatud liigutused, ebatavaline aktiivsus;
- agressiivsus, agitatsioon, ärevus, depressioon, ärrituvus ja ebanormaalne käitumine;
- kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, ebamugavustunne maos ja oksendamine.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st)

- kõhukinnisus;
- ebamugavustunne rinnus;
- vere esinemine uriinis;
- rappumine või värin;
- topeltnägemine või hägune nägemine;
- lihasvalu, lihastõmbused;

- hingeldus või valu rinnus;
- maksa analüüsi tulemuste tõusud (nähtavad vereanalüüsis);
- viha, rahutus või nutuvalmidus, liigne teadlikkus ümbritsevast, unehäired.

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st)

- suguiha muutused;
- desorienteeritus;
- laienenud pupillid, nägemisraskused;
- rinnanäärmete turse meestel;
- liigne higistamine, naha punetus, nahapinnast kõrgem punetav lööve.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10000-st)

- südameinfarkt;
- äkksurm;
- lihaskrambid;
- väikesed punased täpid nahal;
- ajupõletik või ajuarterite ummistus;
- maksafunktsiooni kõrvalekalded, sh maksapuudulikkus ja kooma;
- analüüsitulemuste muutused – sh maksa ja vereanalüüsid;
- enesetapukatse, ebanormaalsed mõtted, tundetus või emotsioonide puudumine, tegevuste pidev kordamine, liigne keskendumine ühele asjale;
- sõrmede ja varvaste tuimus, surin, muutunud värvus (valgest sinakani, seejärel punaseks) koos külmatundega (Raynaud' fenomen).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- migreen;
- väga kõrge palavik;
- aeglane või kiire südame löögisagedus või südame vahelöögid;
- suur krampihoog (*grand mal* konvulsioonid);
- tõe mittevastavate asjade uskumine, segasus;
- tugev kõhuvalu, sageli koos iivelduse ja oksendamisega;
- probleemid aju veresoontega (insult, aju arteriit või oklusioon ajus);
- kuiv nahk.

Toime kasvule

Kui metüülfenidaati on kasutatud rohkem kui aasta jooksul, võib see mõnedel lastel põhjustada kasvu aeglustumist. See esineb vähem kui 1 lapsel 10-st.

- Võib puududa kehakaalu või kehapiikkuse juurdekasv.
- Teie arst jälgib hoolikalt teie või teie lapse kehapiikkust ja kehakaalu, aga ka seda, kui hästi teie või teie laps sööb.
- Kui teie või teie laps ei kasva ootuspäraselt, võidakse ravi metüülfenidaadiga lühikeseks ajaks katkestada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.raviamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas MEDIKINET'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida MEDIKINET sisaldab

- Toimeaine on metüülfenidaatvesinikkloriid.

MEDIKINET 5 mg, tabletid

Üks tablett sisaldab 5 mg metüülfenidaatvesinikkloriidi, mis vastab 4,35 mg metüülfenidaadile.

MEDIKINET 10 mg, tabletid

Üks tablett sisaldab 10 mg metüülfenidaatvesinikkloriidi, mis vastab 8,65 mg metüülfenidaadile.

MEDIKINET 20 mg, tabletid

Üks tablett sisaldab 20 mg metüülfenidaatvesinikkloriidi, mis vastab 17,3 mg metüülfenidaadile.

- Teised koostisosad on: mikrokristalne tselluloos, preleželatiniseeritud maisitärklis, kaltsiumvesinikfosfaatihüdraat, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat.

Kuidas MEDIKINET välja näeb ja pakendi sisu

MEDIKINET 5 mg, tabletid

Valged, ümmargused tabletid, poolitusjoonega mõlemal küljel ja sälgud servades, mõlemale poole poolitusjoont on sisse pressitud märgis "S"

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Karbid, mis sisaldavad 28 või 30 tabletti, mis on pakendatud PVC/PE/PVdC alumiiniumfooliumist blistritesse.

MEDIKINET 10 mg, tabletid

Valged, ümmargused tabletid, poolitusjoonega mõlemal küljel ja sälgud servades, mõlemale poole poolitusjoont on sisse pressitud märgis "M"

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Karbid, mis sisaldavad 28 või 30 tabletti, mis on pakendatud PVC/PVdC alumiiniumfooliumist blistritesse.

MEDIKINET 20 mg, tabletid

Valged, ümmargused tabletid, poolitusjoonega mõlemal küljel ja sälgud servades, mõlemale poole poolitusjoont on sisse pressitud märgis "L"

Karbid, mis sisaldavad 28 või 30 tabletti, mis on pakendatud PVC/PE/PVdC alumiiniumfooliumist blistritesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

58638 Iserlohn

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Algol Pharma OÜ

Väike - Paala 1

11415 Tallinn

Tel.: +372 6056014

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Saksamaa	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten
Belgia	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Küpros	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg

Eesti	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Prantsusmaa	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Comprimés
Iirimaa	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tablets
Itaalia	Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg
Läti	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Leedu	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletès
Portugal	Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimidos
Rumeenia	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimat
Slovakkia	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg
Sloveenia	Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tablete

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014