

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
(käsimüügiravim*)

Cetrix 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Tsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Cetrixit täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Cetrix ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cetrix'i kasutamist
3. Kuidas Cetrixit kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cetrixit säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CETRIX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cetrix sisaldab toimeainet tsetirisiindivesinikkloriid. Cetrix kuulub süsteemselt kasutatavate antihistamiinikumide hulka, mida kasutatakse allergia (ülitundlikkus) raviks.

Täiskasvanutel ja lastel alates 6 aasta vanusest on Cetrix näidustatud järgmistel juhtudel:

- hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamiseks.
- kroonilise nõgeslööbe (krooniline idiopaatiline urtikaaria) sümptomite leevendamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CETRIXI KASUTAMIST

Ärge võtke Cetrixit

- kui olete allergiline (ülitundlik) tsetirisiindivesinikkloriidi või Cetrix'i mõne koostisosa suhtes;
- kui olete allergiline (ülitundlik) hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (sarnane toimeaine teises ravimis) suhtes;
- kui teil on raske neeruhaigus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cetrix

Enne ravi alustamist konsulteerige oma arstiga:

- kui teil on neerufunktsiooni kahjustus, vajadusel vähendatakse teil ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.
- kui teil on probleeme urineerimisega (nt selgroovigastus, eesnäärme- või põieprobleemid).
- kui teil on epilepsia või soodumus krampide tekkeks.
- kui teile on plaanis teha allergilisi nahateste. Sellisel juhul tuleb Cetrix'i kasutamine lõpetada kolm päeva enne testide tegemist.

Lapsed

Alla 6-aastastel lastel ei ole õhukese polümeerikattega tablettide kasutamine soovitatav, sest tabletid ei võimalda annust sobivalt kohandada.

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Tsetirisiinil ei esine koostoimeid teiste ravimitega.

Cetrix'i võtmine koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta oluliselt tsetirisiini imendumise määra.

Puuduvad tõendid, et oleks koostoime alkoholi (alkoholi sisaldus veres 0,5 promilli, mis vastab ühele klaasile veinile) ja tsetirisiini tavaannuste kooskasutamisel. Nagu ka kõigi antihistamiinikumide puhul, on soovitatav alkoholi samaaegsest tarvitamisest hoiduda.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Nagu teiste ravimite puhul, tuleks Cetrix'i kasutamist rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleks Cetrix'i võtmine lõpetada raseduse ajal.

Ärge kasutage Cetrix'i rinnaga toitmise ajal, sest tsetirisiin eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast Cetrix'i kasutamist soovitatud annuses.

Kui te kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega, ärge ületage soovitatud annust. Peaksite hoolikalt jälgima oma reaktsiooni ravimile.

Kui olete tundlik patsient, võib ravimi samaaegne manustamine alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainetega mõjutada ka teie tähelepanu ja reageerimisvõimet. Kui tunnete sellist toimet, hoiduge autojuhtimisest või masinatega töötamisest.

3. KUIDAS CETRIXIT VÕTTA

Kuidas ja millal tuleb Cetrixit võtta

Võtke Cetrixit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

10 mg (1 tablett) üks kord päevas.

6...12-aastased lapsed:

5 mg (pool tabletti) kaks korda päevas.

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Cetrix'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Ravi kestuse määrab teie arst.

Kui te võtate Cetrixit rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Cetrixit rohkem kui ette nähtud või kui laps on võtnud ravimit kogemata, teavitage sellest oma arsti või võtke ühendust lähima haiglaga info saamiseks.

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

Üleannustamise korral võivad allpool loetletud kõrvaltoimed ilmned suurenenud intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja urineerimiskäitumised.

Kui te unustate Cetrixi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Cetrixi võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cetrixi põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad ülitundlikkusreaktsiooni esmased nähud, lõpetage Cetrixi võtmine ning pöörduge viivitamatult arsti poole. Ülitundlikkusreaktsiooni nähud võivad olla järgmised: suu, näo ja/või kõri turse, hingamisraskused (pigistustunne rinnus või hingeldamine), järsk vererõhu langus minestamise või šokiga.

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed vastavalt nende esinemissagedusele:

Sage (võib tekkida 1...10 inimesel 100-st):

- väsimus
- suukuivus, iiveldus, kõhulahtisus
- pearinglus, peavalu
- unisus
- farüngiit (neelupõletik), riniit (turse ja ärritus ninas).

Aeg-ajalt (võib tekkida 1...10 inimesel 1000-st):

- kõhuvalu
- astenia (äärmuslik väsimus), üldine halb enesetunne
- paresteesia (ebaloomulik nahatundlikkus)
- rahutus
- sügelus, nahalööve.

Harv (võib tekkida 1...10 inimesel 10000-st):

- tahhükardia (liiga kiired südamelöögid)
- tursed
- allergilised reaktsioonid, mõnikord rasked (väga harv)
- häired maksafunktsioonis
- kehakaalu tõus
- krampid, liigutuste häired
- agressiivus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus
- nõgestõbi.

Väga harv (võib tekkida vähem kui ühel inimesel 10000-st):

- trombotsütopeenia (madal trombotsüütide arv, mis võib väljenduda tavalisest kergemas veritsuses)
- akommodatsiooni häired, nägemise hägustumine, okulogüüriline kriis (tahtele allumatu silmade pööramine)
- minestus (sünkoop), värinad (treemor), düsgeusia (maitse muutumine), düstoonia (tahtmatud liigutused ja kestev lihaste kontraktsioon), düskineesia (tahtlike liigutuste sooritusvõime halvenemine)

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

- tikid
- uriini eritumise häired
- eluohtlik allergiline reaktsioon, sealhulgas angioödeem (põhjustab näo- või kõriturset)
- paikne ravimlööve.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- söögiisu suurenemine
- enesetapumõtted
- amneesia, mäluhäired
- vertiigo (peapööritus)
- kusepeetus (võimetus kusepõit täielikult tühjendada).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CETRIXIT SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cetrixit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage ravimit, kui märkate, et tabletid on kahjustunud või tunduvad muul moel kahtlased.

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cetrix sisaldab

- Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.
- Abiained
Tableti sisus on mikrokristalne tselluloos, eelželatiniseeritud tärklis, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.
Tableti kattes on polüdekstroos, hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool.

Kuidas Cetrix välja näeb ja pakendi sisu

Välimus:

Valge ümmargune, kumer, ühel küljel asuva poolitusjoonega ja „5“ logoga tablett. Diameeter on 7 mm.

Pakendi suurus:

7, 10, 14 või 20 tabletti (PVC/PVdC/Al blisterkarbis).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

Vitabalans OY
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Soome

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Vitabalans Pharma OÜ
Hõbekuuse 26
12111 Tallinn
Tel: 6230018

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
(retseptiravim*)

Cetrix 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Tsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Cetrix ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cetrixi kasutamist
3. Kuidas Cetrixit kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cetrixit säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CETRIX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cetrix sisaldab toimeainet tsetirisiindivesinikkloriid. Cetrix kuulub süsteemselt kasutatavate antihistamiinikumide hulka, mida kasutatakse allergia (ülitundlikkus) raviks.

Täiskasvanutel ja lastel alates 6 aasta vanusest on Cetrix näidustatud järgmistel juhtudel:

- hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamiseks.
- kroonilise nõgeslööbe (krooniline idiopaatiline urtikaaria) sümptomite leevendamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CETRIX'I KASUTAMIST

Ärge võtke Cetrixit

- kui olete allergiline (ülitundlik) tsetirisiindivesinikkloriidi või Cetrixi mõne koostisosa suhtes;
- kui olete allergiline (ülitundlik) hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (sarnane toimeaine teises ravimis) suhtes;
- kui teil on raske neeruhaigus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cetrix

Enne ravi alustamist konsulteerige oma arstiga:

- kui teil on neerufunktsiooni kahjustus, vajadusel vähendatakse teil ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.
- kui teil on probleeme urineerimisega (nt selgroovigastus, eesnäärme- või põieprobleemid).
- kui teil on epilepsia või soodumus krampide tekkeks.
- kui teile on plaanis teha allergilisi nahateste. Sellisel juhul tuleb Cetrixi kasutamine lõpetada kolm päeva enne testide tegemist.

Lapsed

Alla 6-aastastel lastel ei ole õhukese polümeerikattega tablettide kasutamine soovitatav, sest tabletid ei võimalda annust sobivalt kohandada.

Võtmine koos teiste ravimitega

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Tsetirisiinil ei esine koostoimeid teiste ravimitega.

Cetrix'i võtmise koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta oluliselt tsetirisiini imendumise määra.

Puuduvad tõendid, et oleks koostoime alkoholi (alkoholi sisaldus veres 0,5 promilli, mis vastab ühele klaasile veinile) ja tsetirisiini tavaannuste kooskasutamisel. Nagu ka kõigi antihistamiinikumide puhul, on soovitatav alkoholi samaaegsest tarvitamisest hoiduda.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Nagu teiste ravimite puhul, tuleks Cetrix'i kasutamist rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleks Cetrix'i võtmise lõpetada raseduse ajal.

Ärge kasutage Cetrix'i rinnaga toitmise ajal, sest tsetirisiin eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast Cetrix'i kasutamist soovitatud annuses.

Kui te kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega, ärge ületage soovitatud annust. Peaksite hoolikalt jälgima oma reaktsiooni ravimile.

Kui olete tundlik patsient, võib ravimi samaaegne manustamine alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainetega mõjutada ka teie tähelepanu ja reageerimisvõimet. Kui tunnete sellist toimet, hoiduge autojuhtimisest või masinatega töötamisest.

3. KUIDAS CETRIXIT VÕTTA

Kuidas ja millal tuleb Cetrixit võtta

Võtke Cetrixit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

10 mg (1 tablett) üks kord päevas.

6...12-aastased lapsed:

5 mg (pool tabletti) kaks korda päevas.

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Cetrix'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Ravi kestuse määrab teie arst.

Kui te võtate Cetrixit rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Cetrixit rohkem kui ette nähtud või kui laps on võtnud ravimit kogemata, teavitage sellest oma arsti või võtke ühendust lähima haiglaga info saamiseks.

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

Üleannustamise korral võivad allpool loetletud kõrvaltoimed ilmned suurenenud intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja urineerimiskäigud.

Kui te unustate Cetrixi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Cetrixi võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cetrixi põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad ülitundlikkusreaktsiooni esmased nähud, lõpetage Cetrixi võtmine ning pöörduge viivitamatult arsti poole. Ülitundlikkusreaktsiooni nähud võivad olla järgmised: suu, näo ja/või kõri turse, hingamisraskused (pigistustunne rinnus või hingeldamine), järsk vererõhu langus minestamise või šokiga.

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed vastavalt nende esinemissagedusele:

Sage (võib tekkida 1...10 inimesel 100-st):

- väsimus
- suukuivus, iiveldus, kõhulahtisus
- pearinglus, peavalu
- unisus
- farüüngiit (neelupõletik), riniit (turse ja ärritus ninas).

Aeg-ajalt (võib tekkida 1...10 inimesel 1000-st):

- kõhuvalu
- asteenia (äärmuslik väsimus), üldine halb enesetunne
- paresteesia (ebaloomulik nahatundlikkus)
- rahutus
- sügelus, nahalööve.

Harv (võib tekkida 1...10 inimesel 10000-st):

- tahhükardia (liiga kiired südamelöögid)
- tursed
- allergilised reaktsioonid, mõnikord rasked (väga harv)
- häired maksafunktsioonis
- kehakaalutõus
- krampid, liigutuste häired
- agressiivus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus
- nõgestõbi.

Väga harv (võib tekkida vähem kui ühel inimesel 10000-st):

- trombotsütopeenid (madal trombotsüütide arv, mis võib väljenduda tavalisest kergemas veritsuses)
- akommodatsiooni häired, nägemise hägustumine, okulogüüriline kriis (tahtele allumatu silmade pööramine)
- minestus (sünkoop), värinad (treemor), düsgeusia (maitse muutumine), düstoonia (tahtmatud liigutused ja kestev lihaste kontraktsioon), düskinesia (tahtlike liigutuste sooritusvõime halvenemine)

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

- tikiid
- uriini eritumise häired
- eluohtlik allergiline reaktsioon, sealhulgas angioödeem (põhjustab näo- või kõriturset)
- paikne ravimlööve.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- söögiisu suurenemine
- enesetapumõtted
- amneesia, mäluhäired
- vertiigo (peapööritus)
- kusepeetus (võimetus kusepõit täielikult tühjendada).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CETRIXIT SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cetrixit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage ravimit, kui märkate, et tabletid on kahjustunud või tunduvad muul moel kahtlased.

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cetrix sisaldab

- Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.
- Abiained
Tableti sisus on mikrokristalne tselluloos, eelzlatiniseeritud tärklis, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.
Tableti kattes on polüdekstroos, hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool.

Kuidas Cetrix välja näeb ja pakendi sisu

Välimus:

Valge ümmargune, kumer, ühel küljel asuva poolitusjoonega ja „5“ logoga tablett. Diameeter on 7 mm.

Pakendi suurus:

30, 50 või 100 tabletti (PVC/PVdC/Al blisterkarbis).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

Vitabalans OY
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Soome

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Vitabalans Pharma OÜ
Hõbekuuse 26
12111 Tallinn
Tel: 6230018

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014

* selgitus – 7, 10, 14 ja 20 tk pakendis – käsimüügiravim
30, 50 ja 100 tk pakendis - retseptiravim