

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Faringodol forte 150 mg losengid**

Koliinsalitsülaad

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.** Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 1...2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Faringodol forte ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Faringodol forte kasutamist
3. Kuidas Faringodol forte't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Faringodol forte't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Faringodol forte ja milleks seda kasutatakse**

Faringodol forte losengides (imemistablettides) sisalduv koliinsalitsülaad on salitsüülhappe derivaat. Salitsülaatidel on põletikuvastane, sealhulgas ka valuvaigistav toime. Koliini manustamine suurendab süljeeritust, mis lisandub preparaadi põletikuvastasele toimele. Koliinsalitsülaadil on nõrk bakteritsiidne toime.

Faringodol forte losenge sobib kasutada neelu, suu limaskesta, igeme ja hambajuureümbrise põletiku sümptomaatiliseks raviks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Faringodol forte kasutamist**

##### **Ärge kasutage Faringodol forte losenge:**

- kui te olete salitsülaatide, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) koostisosade suhtes allergiline
- söögitoru veenilaiendite korral (verejooksu oht)
- kui teil on fenüülketonuuria
- kui teie alla 12-aastasele lapsele on näidustatud atsetüülsalitsüülhapet sisaldavaid ravimeid

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

- kui te olete rase
- seedetrakti põletikuliste haiguste, peptilise haavandtõve või bronhiaalastma korral
- kui teie laps on alla 12-aastane

Enne Faringodol forte kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

##### **Muud ravimid ja Faringodol forte**

Salitsülaadid võivad vähendada samaaegselt manustatud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite toimet ning suurendada rahustite, uinutite, veresuhkru taset alandavate ravimite ja antikoagulantide toimet.

Nii steroidsed kui mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja vere hüübivust vähendavad ravimid võivad salitsülaatidega koosmanustamisel suurendada maoverejooksu riski.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

### **Rasedus ja imetamine**

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada juhul kui arst nii soovib. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

### **3. Kuidas Faringodol forte´t kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

*Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:* tavaliselt üks loseng 4...6 korda päevas.

*6...12-aastased lapsed:* maksimaalne annus on 4 losengi päevas.

Kui kurguvalu ei vähene 1...2 päeva jooksul, tuleb konsulteerida arstiga.

### **Kui te kasutate Faringodol forte´t rohkem kui ette nähtud**

Ravimvormi (losengid) ja minimaalse imendumise tõttu on üleannustamise võimalus äärmiselt ebatõenäoline.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Harva võivad suukaudsete salitsülaatide kasutamisel tekkida allergilised reaktsioonid (naha punetus või lööve, kõha, ninakinnisus, näo turse, neelamis- ja hingamisraskus) või seedetrakti limaskesta kahjustus (kõhuvalu, oksendamine, seedetrakti verejooks).

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas Faringodol forte´t säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida Faringodol forte sisaldab**

- Toimeaine on koliinsalitsülaat.

- Teised abiained on isomalt, maltitoolilahus, mündiõli (osaliselt dementoliseeritud), kaaliumatsesulfaam ja aspartaam.

**Kuidas Faringodol forte välja näeb ja pakendi sisu**

Valkjad või helekollakad, silindrikujulised, õrnalt kaksikkumerad losengid.  
PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakend pappkarbis, mis sisaldab 16 või 32 losengi.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

**Müügiloa hoidja:**

Omega Pharma Baltics SIA,  
K. Ulmaņa 119, Mārupe LV-2167, Läti

**Tootja:**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,  
Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja kohalik esindaja Eestis:

Omega Pharma Baltics SIA  
K. Ulmaņa 119  
Mārupe LV-2167  
Läti

Tel: +371 677 83478

Faks: +371 677 83479

E-post: eesti@omega-pharma.lv

**Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013**