

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Broncophen, siirup

Aed-liivatee vedelekstrakt, altee juure vedelekstrakt

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Broncophen'i täpselt juhistele vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu 5 päeva jooksul, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Broncophen ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Broncophen'i võtmist
3. Kuidas Broncophen'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Broncophen'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON BRONCOPHEN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Broncophen on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Leevendab kurguärritust ja soodustab rögaeritust ülemiste hingamisteede viirushaigustega kaasneva köha puhul.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BRONCOPHEN'I VÕTMIST

Ärge võtke Broncophen'i

Kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete, teiste *Lamiaceae* perekonda kuuluvate taimede või Broncophen'i mõne koostisosa suhtes.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6 („Lisainfo“).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Broncophen

Kui teil tekib palavik, hingeldus ja/või mädane röga, tuleb konsulteerida arstiga.

Ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 4-aastastel lastel, sest puuduvad vastavad andmed ja vajalik on konsulteerida arstiga.

Broncophen siirupit ei tohi kasutada alkoholisoolevusega patsiendid. Rasedate, last rinnaga toitvate emade, laste ja kõrge riskiga gruppide puhul (nt maksahaigusega või epilepsiaga patsiendid) on vajalik ettevaatus.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna ravim sisaldab alkoholi ning puuduvad piisavad andmed selle kasutamise kohta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele ei ole uuritud.

Oluline teave mõningate Broncophen'i koostisainete suhtes

- Informatsioon diabeetikutele: 5 ml (üks annus) sisaldab 1,75 g sahharoosi, mis vastab ligikaudu 0,15 leivaühikule (LÜ). Sellega tuleb arvestada suhkurtõvega patsientide puhul.
- Alkohol: See ravimpreparaat sisaldab 285 mg etanooli iga 5 ml kohta. Täiskasvanute ja vähemalt kahe aasta vanuste noorukite puhul vastab üksikannuse alkoholisisaldus 14,36 ml õllele või 5,98 ml veinile. Nelja- kuni kahe aasta vanuste laste puhul vastab üksikannuse alkoholisisaldus 7,18 ml õllele või 2,99 ml veinile (vt „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Broncophen”).
- Säilitusained: Broncophen sisaldab säilitusaineid metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat. Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalikud ka hilised reaktsioonid) (vt „Ärge võtke Broncophen'i”).

3. KUIDAS BRONCOPHEN'I VÕTTA

Võtke Broncophen'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

12-aastased ja vanemad noorukid ning täiskasvanud:

10 ml iga 3 tunni järel kuni 6 korda ööpäevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 60 ml.

4...12-aastased lapsed:

5 ml iga 3 tunni järel kuni 6 korda ööpäevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 30 ml.

Alla 4-aastased lapsed:

Ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 4-aastastel lastel, sest puuduvad vastavad andmed ja vajalik on konsulteerida arstiga.

Manustamisviis:

Suukaudne.

Võtke Broncophen'i lahjendamata, kasutades manustamiseks kaasasolevat mõõtekorki, millel on skaala vahemikus 2,5 ml kuni 20 ml.

Vajadusel võite Broncophen'i võtta lahjendatult vees või soojas tees.

Ravi kestus:

Ravi Broncophen'iga peab piirduma 5 ööpäevaga. Kui selleks ajaks ei ole toimunud olulist paranemist, tuleb pöörduda arsti poole, sest teie haigus võib olla tõsisem.

Kui te võtate Broncophen'i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud seda ravimit soovitatavast oluliselt suuremas annuses, võivad ravimi teadaolevad kõrvaltoimed esineda tugevamal kujul. Sel juhul teavitage oma arsti. Vajadusel otsustab arst, milliseid meetmeid on vaja rakendada.

Kui te unustate Broncophen'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Broncophen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Seoses aed-liivateed sisaldavate ravimitega on esinenud ülitundlikkusreaktsioone, aga ka seedetrakti häireid. Esinemissagedus ei ole teada.

5. KUIDAS BRONCOPHEN'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida pudel originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pärast kasutamist tuleb pudel tihedalt sulgeda. Pärast pudeli esmakordset avamist tohib kasutada seda 4 nädala jooksul.

Ärge kasutage Broncophen'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Broncophen sisaldab

- Toimeained on:

1 ml siirupit sisaldab:

154 mg aed-liivatee vedelekstrakti (1:2...2,5)

Ekstrahent: ammoniaagi lahus 10% (m/m)/glütserool 85% (m/m)/etanool 90% (v/v)/vesi (1/20/70/109)

132 mg altee juure vedelekstrakti (1:20)

Ekstrahent: vesi

- Abiained on:

vaarikasiirup, askorbiinhape, sahharoos, metüülparahüdroksübensoaat (E218),

propüülparahüdroksübensoaat (E216), etanool, puhastatud vesi.

Kuidas Broncophen välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen on aed-liivatee ja vaarika lõhna ning maitsega pruunikaspunane viskoosne vedelik suukaudseks kasutamiseks.

Lahus on pakendatud 150 ml merevaikkollastesse klaaspudelitesse, millel on keeratav kaitserõngaga plastikkork. Pakendatud pappkarpi. Pakendis on kaasas mõõtekork, millele on märgitud skaala vahemikus 2,5 ml kuni 20 ml, mis võimaldab täpselt välja mõõta soovitatava annuse.

Looduslike toimeainetega ravimpreparaatides, nagu Broncophen, võib esineda lahuse muutumist helbeliseks, samuti ravimi sadestumist või kogunemist keeratava korgi sisepinnale. See ei mõjuta ravimpreparaadi kvaliteeti ega toimet.

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21,
1160 Vienna
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati koostölastatud juunis 2013