

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Decatylen, 0,25 mg/0,03 mg losengid Dekvaliinkloriid/tsinhokaiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Decatylen ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Decatylen'i kasutamist
3. Kuidas Decatylen'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Decatylen'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Decatylen ja milleks seda kasutatakse

Decatylen losengid (imemistabletid) hävitavad baktereid ja viirusi, mis võivad põhjustada kurguvalu ja suupõletikke. Losengid sisaldavad ka valu leevendavat ainet.

Decatyleni losengid on üldiselt hästi talutavad ega põhjusta limaskestade ärritust. Decatylen ei põhjusta kaariest ja seda võivad kasutada ka diabeetikud.

Decatyleni kasutatakse suu ja neelu antiseptikaks ja valu leevendamiseks bakterite ja seente poolt põhjustatud infektsioonide korral.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Decatylen'i kasutamist

Ärge kasutage Decatylen'i

- kui olete dekvaliinkloriidi või tsinhokaiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 - kui te olete allergiline teatud spetsiifiliste ainete suhtes, mida nimetatakse kvaternaarseks ammooniumühenditeks (näiteks bensalkooniumkloriid).
- Kui teil esineb mõni ülaltoodud allergiatest, ärge kasutage Decatyleni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Decatylen'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Pidage nõu arstiga

- kui teil esineb kõrge palavik,
- kui teie haigusümptomid ei leevendu ühe nädala jooksul.

Muud ravimid ja Decatylen

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Hambapasta: Decatyleni tõhusust vähendavad tavalises hambapastas sisalduvad anioonsed tensiidid. Seega peate ootama vähemalt pool tundi pärast hammaste pesemist, enne kui kasutate Decatyleni.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamise ajal võib dekvaliini/tsinhokaiini kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuigi vastavaid uuringuid ei ole läbi viidud, on väga ebatõenäoline, et Decatylen mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Decatylen sisaldab sorbitooli

Decatyleni losengid on magustatud sorbitooliga (E420), mis ei põhjusta hammaste lagunemist (kaariest).

Losengid sobivad kasutamiseks ka diabeetikutele.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas Decatylen'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis on tavaline annus järgmine.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Laske ühel losengil iga 2 tunni järel suus aeglaselt sulada. Põletiku tunnuste taandumisel võtke 1 loseng iga 4 tunni järel.

Üle 4-aastased lapsed

Laske ühel losengil iga 3 tunni järel suus aeglaselt sulada. Põletiku tunnuste taandumisel võtke 1 loseng iga 4 tunni järel.

Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga nõrk või liiga tugev, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Decatylen'i rohkem kui ette nähtud

Üldiselt on dekvaliin/tsinhokaiin hästi talutav. Üleannustamine võib siiski põhjustada pearinglust, oksendamist ja söögitoru ärritusnähte.

Üleannustamise ravi on sümptomaatiline. Vajadusel võib kasutada leevendavaid vahendeid, oksendamist ja maoloputust tuleks vältida.

Kui Te unustate Decatylen'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga vähestel juhtudel on esinenud lööbe ja sügelusega allergilisi reaktsioone. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimete sagedus on defineeritud järgnevalt: väga sage ($\geq 1/10$), sage ($\geq 1/100$ kuni $< 1/10$), aeg-ajalt ($\geq 1/1,000$ kuni $< 1/100$), harv ($\geq 1/10,000$ kuni $< 1/1,000$), väga harv ($< 1/10,000$), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Teadmata: düspnoe

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Decatylen'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olemjäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Decatylen sisaldab

- Toimeained on dekvaliinkloriid ja tsinhokaiinvesinikkloriid. Iga loseng sisaldab 0,25 mg dekvaliinkloriidi (*Dequalini chloridi*) ja 0,03 mg tsinhokaiinvesinikkloriidi (*Cinchocaini hydrochloridi*).

- Teised koostisosad on sorbitool (E420), talk, magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, piparmündi lõhnaaine, piparmündiõli.

Kuidas Decatylen välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ümarad, lameda äärega losengid, mille ühel küljel on sälk ja teisel küljel kiri „D“.

Tabletid on pakendatud PVC/Aclar-alumiiniumist blisterpakenditesse.

Pakendis on 20, 30 või 40 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.

Lagoas Park,

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Tootjad

Mepha Pharma GmbH
Marie-Curie-Str.8
79539 Lörrach
Saksamaa

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3,
89143 Blaubeuren
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Eesti Vabariik
Telefon: +372 6610801

Infoleht on viimati koostöölstatud märtsis 2014